

## ONCOLOGIA

### Avanzamenti nel trattamento del carcinoma coloretale

Il carcinoma del colon-retto è in assoluto il tumore a maggiore insorgenza nella popolazione italiana, con 53.000 nuove diagnosi stimate nel 2017 (29.500 uomini e 22.900 donne). Nella classifica dei tumori più frequenti per gruppi di età il carcinoma del colon-retto occupa sempre posizioni elevate, variando nelle diverse età tra l'8% e il 14% negli uomini e tra il 4% e il 17% nelle donne. La diffusione dei fattori di rischio, l'anticipazione diagnostica e l'aumento dell'età media della popolazione sono alla base della progressiva crescita dell'incidenza di questo tumore negli anni passati.

“Il carcinoma del colon-retto risente molto degli stili di vita scorretti (alimentazione squilibrata e troppo ricca di grassi) sottolinea il Prof. **Carmine Pinto**, Direttore dell'Oncologia Medica al Clinical Cancer Centre dell'AUSL-IRCCS di Reggio Emilia. La prevenzione primaria risulta fondamentale così come riuscire ad ottenere l'eliminazione dei precursori e una diagnosi precoce del tumore in uno stadio il più possibile iniziale. Negli ultimi anni è stato sviluppato il programma nazionale di screening per il carcinoma coloretale che prevede la ricer-

ca di sangue occulto nelle feci e per i casi risultati positivi al test la successiva colonscopia. Se individuiamo i precursori della neoplasia o la neoplasia durante le prime fasi possiamo intervenire tempestivamente e ottenere i migliori risultati in termini di guarigione. Attualmente il 65% dei pazienti riesce a sconfiggere la malattia”.

Tuttavia circa il 20% dei pazienti presenta metastasi alla diagnosi iniziale e quasi il 50% le sviluppa in seguito. La prognosi di questi pazienti è migliorata globalmente e sensibilmente negli ultimi anni con una sopravvivenza di circa 30 mesi. Questi miglioramenti sono stati legati da una parte alle nuove conoscenze biologiche dall'altra alla individuazione di particolari bersagli molecolari controllabili con farmaci biologici o alla possibilità di avere a disposizione nuovi farmaci.

#### ► Nuovi farmaci

Per il trattamento dei pazienti adulti con tumore del colon retto in stadio avanzato (metastatico) precedentemente trattati o non candidati ad altre cure come chemioterapia o terapie biologiche è da po-

co è rimborsato anche in Italia un farmaco orale basato sulla combinazione di trifluridina (FTD) e tipiracil (TPI).

“La combinazione di trifluridina e tipiracil - afferma il Prof. **Alberto Sobrero**, Responsabile del Dipartimento di Oncologia Medica dell'Ospedale San Martino di Genova - agisce inserendosi direttamente nel DNA, interferendo con la sua funzione e prevenendo in tal modo la proliferazione e la crescita delle cellule tumorali. Questo approccio combatte il cancro in modo diverso rispetto ai trattamenti somministrati in precedenza, permettendoci di rallentare la progressione della malattia senza trattare il paziente nuovamente con le stesse terapie. I dati contenuti nello studio internazionale Recourse (Mayer RJ et al. Randomized trial of TAS-102 for refractory metastatic colorectal cancer. *NEJM* 2015; 372: 1909-19), condotto su 800 pazienti, forniscono evidenze di come questa associazione possa offrire ai malati affetti da carcinoma metastatico refrattario ai trattamenti standard una maggiore sopravvivenza e una riduzione del rischio di morte rispetto al placebo”.



Attraverso il presente QR-Code è possibile ascoltare con tablet/smartphone il commento di Alberto Sobrero